

板橋区のBCG接種について

平成28年4月20日(水)

医療法人社団多比良医院
多比良 清

BCGワクチンは 結核予防ワクチンです

監修 公益財団法人結核予防会結核研究所 名誉所長 森 亨

◆ 結核は昔の病気だと思いませんか？

日本では今でも毎年約2万人の患者が発生している感染症です。高齢の患者さんが多いですが、大人から子供へうつる(感染する)ことも少なくありません。

それに、結核に対する抵抗力はお母さんからもらうことができません。赤ちゃんは結核に対する抵抗力が弱いので、全身性の結核症や結核性髄膜炎になることもあり、重い後遺症を残す可能性もあります。

◆ 板橋区では平成28年4月から集団接種から個別接種に変わりました。

◆ BCGワクチンって？

BCGはウシ型結核菌を弱毒化してつくった生ワクチンです。

管針という器具を上腕の外側の2箇所押し付けて接種します(スタンプ方式)。



◆ BCGワクチンの接種時期

BCGは生後1歳に達するまでに接種します。通常は生後5カ月から生後8カ月に達するまでに接種しますが、地域によっては、もっと早い時期(生後3カ月-)に接種をすることがあります。

なお、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどにより、上記の時期に接種を受けられなかった場合、接種を受けられるようになってから2年間(ただし4歳に達するまで)は、接種を受けることができます。

◆ 接種後の注意

接種したところは直射日光を避けて乾燥させてください。
お風呂に入ってもかまいませんが、接種したところをこすったり、
ひっかいたりしないようにしてください。

◆ 接種後の一般的な経過について

接種後10日頃に接種したところに赤いポツポツができて、その後一部に
小さいうみが出ることがあります。この反応は、接種後4週間頃に最も
強くなりますが、その後は、かさぶたができて接種後3-4ヶ月までにはな
おり、小さな傷痕が残るだけになります。これは正常な反応で、BCG接
種により抵抗力(免疫)が、ついた証拠です。

このような皮膚の変化に対しては、包帯をしたり、パンソウコウをはった
りしないで、そのまま普通に清潔を保ってください。



◆ 副反応について

接種したところが、接種後3ヶ月を過ぎてもジクジクしていたり、一旦乾いたのに再びジクジクしたりすることがあります。

また、BCGを接種した側のわきの下のリンパ節がまれに腫れることがあります。普通はそのまま様子を見てかまいませんが、大きく腫れたり、化膿して自然にやぶれてうみがでることがあります。

これらの症状が現れたり、体調に変化が現れた場合には先生に相談してください。



◆◆◆ コッホ現象について

接種後の反応が早くでた場合（2日から7日の早期にポツポツと発赤出現）結核に既に感染している赤ちゃんにBCGワクチンを接種すると、通常よりも早く、強く接種部位の反応が起こることがあります。これをコッホ現象といいます。

コッホ現象かもしれない、と思ったら

【1】 変化に気付いたら、2-3日以内に必ず接種医を受診してください

この変化（コッホ現象）がでた場合、知らない間にお子さんが結核に感染していた可能性があります。

本当に結核に感染しているかどうかを、きちんと調べる必要があります。集団接種の場合や主治医と連絡が取れないときは、市区町村の予防接種担当課に相談してください。

ただし、救急外来を受診するほどの緊急性はありません。また、近年では子どもが結核にかかる率はとても低くなっているので、調べた結果、結核にかかっていなかったということも多いので、慌てないでください。

【2】接種の2-4週間後には、腫れも落ち着きます

接種部位の皮膚が赤く腫れ、膿を伴う変化が見られる場合でも、ガーゼを当てるなどの処置で大丈夫です。接種後2-4カ月後には針痕が残る程度に治癒します。

コッホ現象の例： 2日から7日の早期にポツポツと発赤が出現



説明は以上です。最後までご覧下さり有り難う御座いました。